

Der Ornithologische Beobachter

Monatsberichte für Vogelkunde
und Vogelschutz.

Erscheint am 15. des Monates.

Publications mensuelles pour l'étude
des oiseaux et leur protection.

Paraît le 15 du mois.

Offizielles Organ der Schweiz. Gesell-
schaft für Vogelkunde und Vogelschutz

Organe officiel de la Société suisse pour
l'étude des oiseaux et leur protection

REDAKTION:

Karl Daut in Bern. ... Alfred Richard, Champ-Bouglin 28, Neuchâtel.

Redaktionskommission — Commission de rédaction:

Dr. K. Bretscher in Zürich, Max Diebold in Aarau, Dr. H. Fischer-Sigwart in Zofingen,
Dr. H. E. Gans à Genève.

Schwarzrückiger Fliegenfänger (*Muscicapa luctuosa* L.) 86, Grauer Fliegenschnäpper (*Muscicapa grisola* L.) 84 und ihr Vorkommen in der Umgebung von Luzern.

Von Dr. Jul. Troller.

Ueber das Vorkommen des zierlichen *Muscicapa luctuosa* in Mitteleuropa finden wir in guten und bekannten Werken der Ornithologie teilweise widersprechende, jedenfalls sich nicht deckende Angaben. Im neuen Naumann*) heisst es: „Dieser Fliegenfänger ist über ganz Europa, den hohen Norden ausgenommen, verbreitet; aber viel häufiger in den südlichen, wie in den gemässigten Teilen, von wo er bis Schweden hinaufgeht. In Griechenland, Italien, dem südlichen Frankreich u. s. w. ist er daher gemein und in Deutschland wohl nicht so zahlreich, doch in den meisten Gegenden bekannt genug“.

Im Friderich**) lesen wir: „Man trifft den Trauerschnäpper im mittleren und südlichen Europa, nordwärts bis zu den Faröerinseln, in England und Skandinavien; strichweise aber auch ganz fehlend. In Deutschland bekannt, aber zu den seltenen Vögeln gehörig“.

Auch in der „Anleitung zur Beobachtung der Vogelwelt

*) Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, Bd. IV, Pag. 165.

**) C. G. Friderich, Naturgeschichte der deutschen Vögel.

von Dr. Carl Zimmer“ finden wir den Trauerfliegenschnäpper als „*recht* seltenen Brutvogel“ bezeichnet.

Während also Naumann von ihm sagt, dass er in Deutschland in den meisten Gegenden als Nistvogel, dies allein kommt hier in Frage, bekannt genug sei, zählen ihn Friderich und Zimmer zu den seltenen Vögeln Deutschlands. Ueber sein Vorkommen in der Schweiz spricht sich keiner der oben angeführten Autoren aus, während wir doch durch Naumann sehr eingehend über das Vorkommen seines nächsten Verwandten, des *Muscicapa albicollis* (Temm.), des Weisshalsigen Fliegenfängers, unterrichtet werden. Nach den Arbeiten von Hartwig*) und Parrot**) soll der Weisshalsige Fliegenfänger als Brutvogel in folgenden Kantonen beobachtet worden sein: St. Gallen, Appenzell, Graubünden und im Jura. Prof. Dr. Th. Studer***) und Dr. V. Fatio***) dagegen sagen in ihrem Katalog Pag. 21, von ihm: „Nistet hie und da im W., C. und S. In O. und W. nur Zugvogel.“ Angaben, die sich mit denjenigen von Hartwig und Parrot, wie sie im neuen Naumann, Pag. 170, Band IV, angeführt sind, nicht decken.

In der Umgebung von Luzern konnte ich bisher leider weder den *Muscicapa albicollis* Temm., noch den *Muscicapa parva* L., den Zwergfliegenfänger finden, trotzdem ich seit Jahren nach ihnen suchte.

Wie bereits erwähnt, finden wir über das Vorkommen des Trauerfliegenfängers in der Schweiz keine speziellen Angaben bei Naumann und Friderich, dagegen zählen ihn Prof. Dr. Studer und Dr. V. Fatio in ihrem Katalog der schweizerischen Vögel zu den ziemlich seltenen Nistvögeln und bezeichnen ihn mit der Häufigkeitsziffer 2, stellen ihn aber betreff Seltenheit auf die gleiche Stufe wie *Athene passerina* L., *Sperlingseule*, *Scops aldrovandi* Villug., *Zwergohreule*, *Oriolus galbula* L., *Pirol*, etc., während z. B. der Uhu, *Bubo maximus* Sibb., der Kolkrahe, *Corvus corax* L., der Mittlere Buntspecht, *Picus medius* L., etc., als ziemlich häufige Nistvögel, mit 3 bezeichnet

*) 1893, Journ. f. Ornith., pag. 129 u. ff., von Hartwig.

**) 1895, ibidem, pag. 1 u. ff., von Parrot.

***) Katalog der schweizerischen Vögel und ihre Verbreitungsgebiete, von Prof. Dr. Th. Studer und Dr. V. Fatio.

werden. Unter der gleichen Häufigkeitsziffer 3 finden wir da-
selbst den Grauen Fliegenschnäpper, *Muscicapa grisola* L.
angeführt. (Fortsetzung folgt.)



Notes sur quelques oiseaux observés sur le lac de Neuchâtel au printemps 1910.

Par *Alf. Richard.*

(Suite.)

Combattant muni de sa collerette (*Machetes pugnax*, ♂ en habit de noces). L'individu en question, le seul que j'aie observé jusqu'ici, faisait partie d'une bande de 50 à 100 échassiers: c'est le 9 mai que je l'aperçus au bord du lac près de La Sauge. Le collerette était d'un roux de rouille, qui me permit de la distinguer de fort loin et qui tranchait sur la livrée terne de ses congénères. Ci-joint les dates concernant le passage de l'espèce au bord de notre lac. — 23 avril. Vu un vol d'une cinquantaine d'échassiers à la livrée terne, absolument silencieux. — 26 avril: Revu les mêmes; la troupe est réduite de moitié; muets comme d'habitude. — 9 mai: Mes échassiers muets sont bien des combattants; j'en distingue un qui est orné d'une collerette brun de rouille. — 13 mai. Canards et échassiers ont diminué; je remarque le reste de la bande de combattants observée ces jours passés, mais ils sont mêlés à d'autres espèces, entre autres 4 barges. — 14. mai. Le vol de combattants, barges, vanneaux-pluviers est grandement réduit: grâce au temps beau et chaud la plupart de ces oiseaux sont partis.

Héron cendré (*Ardea cinerea*). Il existe près de Cudrefin les restes d'une ancienne colonie de hérons cendrés. J'ai observé cet oiseau à la pointe nord du lac durant toute la belle saison, sans avoir pu constater où il a niché. — 23 avril. Un héron cendré, plage de Witzwil. — 3 mai. Les employés du bateau à vapeur me disent qu'ils aperçoivent souvent jusqu'à 10 hérons cendrés à la fois. Cri du héron cendré entre Cudrefin et La Sauge. — 22 juillet. Un héron cendré près de La Sauge. — 23 juillet. Cris des hérons cendrés entre Cudrefin et La Sauge, dans les bois inondés. — 24 juillet. Observé plusieurs