

Basel (1895) und messen 90:67 bez. 91:68,5 mm., sie sind grösser als Adlereier.

2. **Grauer, Mönchs- oder Kuttengeier.** In der Schweiz nur Irrgast. Das Gelege besteht aus einem Ei. Das, meinige, aus Rumänien stammend, misst 90:70,5 mm., hat also ziemlich bauchige Form. Rauhschalig, auf schmutziggelblich weissem Grunde viele braune Spritzer, die stellenweise Nester bilden.

3. **Aasgeier, Schmutzgeier.** Soll am Salève bis 1887 gebrütet haben. Das Gelege besteht aus 2 Eiern, zuweilen auch aus nur einem. Sie sind bedeutend kleiner als die Eier von obigen Arten: (die meinigen messen 71:53,5 bez. 61,6:41 mm., das grössere kommt aus Mogador, Marokko, Mai 1904, das andere aus Cadix, Februar 1896). Ich zähle sie zu den schönsten Raubvogeleiern (Falkeneiertypus), umbrabraun mit noch dunkelbrauneren Flecken: glanzlos, schöne Eiform.



Vogelschutz.  
*Protection des oiseaux.*



**Espèce en voie de disparition.**

Il y a bientôt 40 ans que l'ectopiste migrateur (*Ectopistes migratorius*) a disparu des Etats-Unis, malgré l'abondance de l'espèce. Les journaux américains annoncent qu'une nouvelle espèce, *Columba fasciata*, est également menacée d'une destruction totale. Ce pigeon, niche dans les montagnes Rocheuses, le Mexique et la Colombie, il se rassemble en grands vols pour passer dans les vallées de la Californie, au climat plus doux. Les chasseurs de cette région en font, paraît-il, des hécatombes formidables et, comme l'espèce n'a qu'une couvée par an, elle ne tardera pas de subir le sort de la colombe voyageuse, à moins que les Sociétés protectrices américaines n'interviennent énergiquement.

(*La Nature.*)



**Vogel- und Naturschutz!**

Im Amtsblatte des Kantons Luzern waren 14 Tage vor Beginn der Jagd die Banngebiete verzeichnet, Zum grössten Erstaunen der gesamten Einwohnerschaft von Sempach war die Schutzzone für das Wassergeflügel auf dem Sempachersee