

Je dois à la courtoisie du chasseur la photographie de ce beau mâle. Il vivait solitaire, depuis 5 ou 6 ans et il était bien connu des gardechasses de la région. Il mesurait, en chaire, 280 ctm. d'envergure, plus d'un mètre de long, et pesait 6900 grm. — Le dernier Vautour barbu signalé, dans le bassin supérieur du Rhône, est celui que PERSY F. FRENKE observa sur Finhaut, en octobre 1898. (Ibis. 1899. p. 658).

Genève, mai 1914.

## Notes ornithologiques de la région du Bosphore.<sup>1)</sup>

Par A. Mathey-Dupras, Colombier.

65. *C. frugilegus*, L. — la Corneille freux. Avec l'automne arrivent d'immenses vols de freux, qui passent la nuit cachés dans les cyprès touffus des nombreux cimetières musulmans des Petits-Champs, de Cassim Pacha, d'Eyoub, de Bulbul-Déré, de Scutari, etc., ce sont des vols de plusieurs centaines d'oiseaux volant et croassant très longuement avant de se giter: le matin, à l'aube, ils repartent dans la campagne. Durant l'hiver 1889—1890, assez rigoureux pour la région, la neige recouvra le sol gelé pendant plusieurs semaines, la colonie de freux qui logeait dans le cimetière de Bulbul-Déré (Scutari) fut éprouvée, chaque matin de très nombreux cadavres de freux gisaient sur le sol: à la fin de la journée les chiens marrons, qui pullulaient à cette époque, avaient tout fait disparaître.

Pendant la période d'hiver quelques freux stationnaient toute la journée aux abords de la Caserne d'artillerie du Taxim, ou sur le Champ de Mars, picorant, en compagnie de leurs choucas accompagnateurs, dans le crottin de cheval.

Ci-après quelques dates concernant l'espèce freux:

	d é p a r t	a r r i v é e
1888	—	mi-novembre
1889	25 mars	17 »
1890	15 »	25 »
1891	23 »	20 »
1892	20 »	19 »
1893	24 »	23 »
1894	22 »	—

Musée Coll. amérie.: 2 exemplaires.

66. *Pica caudata*, BOIE. — *P. pica*, L. — la pie. Dans toute la région on rencontre l'agasse surtout aux abords des villages et des cimetières. Dès la fin de février les couples commencent à construire leur nid. En décembre et en janvier nous avons souvent observé des vols de 30 à 40 pies, ce qui laisserait supposer la présence de nombreux individus migrants sur les deux rives du Bosphore.

<sup>1)</sup> Voir „O. B.“, fasc. 2 et 7, 1919/20 - fasc. 2 à 4, 7 à 10, 1920/21.

Dans la belle saison, cet oiseau est commun.

Musée Coll. améric. : 2 exemplaires.

67. *Garrulus glandarius*, L. — le Geai. C'était toujours au moment de la migration d'automne (fin-septembre à mi-octobre) que nous avons vu, suspendus à la devanture d'un marchand de gibier à Péra, quelques geais ainsi que des ramiers, des pigeons colombins, des tourterelles des bois, parfois un ou deux casse-noix. Nous n'avons entendu le cri de cet oiseau que dans la forêt de Belgrade, aux abords des Bends.

Le Musée du Collège américain possède deux geais naturalisés, ils sont étiquetés: «*Corvus melanocephala* = Black-Headed Jay». ALLEX, A. (Oiseaux des environs de Constantinople, p. 2) cite sa capture d'un geai melanocephale, dans la forêt de Belgrade, l'oiseau avait dans l'oesophage un lézard vert en deux morceaux et quelques débris d'insectes dans l'estomac. Serait-ce la forme d'Asie mineure *Garrulus garrulus* Krynicki, Kalenicz.

68. *Nucifraga caryocatactes*, L. — le Casse-noix. Espèce de passage, les quelques individus que nous avons pu examiner régulièrement en automne et que l'on vendait comme gibier appartenaient à la Sbsp.: *pachyrhynchus*, R. Bl., ou Casse-noix à bec épais.

69. *Gecinus viridis*, L. — le Pie-vert. Espèce nicheuse, sporadique, rencontrée dans les cultures maraîchères, parmi les figuiers et les abricotiers au Petit Flamour (rière le Taxin) à Kiahathané, à Djendéré dans la forêt de Belgrade, aux abords de Buyuk-Déré. Sur la côte asiatique à Beicos, au-dessus de Candili, de Tchenguellkeui, à Tchamlidja, dans les jardins de Phanaraki. En automne à l'étalage d'un marchand de gibier.

Musée Coll. améric. : un couple.

70. *G. canus*, L. — *Picus viridianus*, WOLF — le Pic cendré. Rare. Observé le long d'Ali bey Sou, vers Top Capou à Kutchukbaloukli: sur la côte asiatique, près de Merdivenkeui (Kourba Déré).

Musée Coll. américain: un couple.

71. *Dryocopus martius*, L. — le Pic noir. Un exemplaire ♂ tué provenant du massif d'Alem-Dagh, de Karakoulak Déré. Parfois en automne un sujet suspendu chez le marchand de gibier.

Coll. améric. : un couple.

72. *Picus major*, L. — le Pic épeiche. Ce grimpeur niche dans les cyprès des cinetières musulmans, mais fréquente surtout les jardins potagers, plantés d'arbres fruitiers.

Musée Coll. améric. : un mâle, 2 femelles.

73. *Picus leuconotus*, BECHST. — le Pie à joues blanches. Se rencontre disséminé sur les deux rives du Bosphore.

Coll. améric. : un couple.

74. *Picus medius*, L. — le Pic mar. Nous avons constaté souvent la présence de l'espèce durant la belle saison, des deux côtés du Bosphore. Nicheuse.

Coll. amér.: trois mâles.

75. *Picus minor*, L. — le Pic épeichette. Une seule fois nous avons observé un couple et quatre juv. près de Tchamlidja (côte d'Asie).

Musée Coll. amér.: un couple.

76. *Junx torquilla*, L. — le Torcol. De passage régulier, plus commun au printemps qu'en automne.

Musée Coll. amér.: deux exemplaires.

77. *Sitta europaea caesia*, MEX & W. — la Sittelle torche-pot. Oiseau sédentaire mais très erratique. Les individus que nous avons observés avaient les plumes de la poitrine et de l'abdomen, d'un beau roux.

Coll. amér.: trois exemplaires.

78. *Sitta Krueperi*, PELZ — la Sittelle de Krueper.

Musée Coll. amér.: deux exemplaires.

79. *S. neumayeri syriaca*, REISER — la Sittelle syriacque. Le torche-pot des rochers se rencontre dans le Haut-Bosphore. Nous avons observé pour la première fois, le 10 avril 1890, un individu de l'espèce contre l'Aqueduc de Baghtché-Keui, notre attention avait été attirée par le cri spécial poussé par cet oiseau. Nous avons une seconde observation, à peu près au même endroit, le 6 mai 1891, nous observions ce torche-pot inspectant assidûment un tas de grosses pierres entassées au bord du chemin.

Musée Coll. amér.: deux exemplaires.

80. *Tichodroma muraria*, L. — le Tichodrome échelle. Espèce de passage assez régulier au début de la mauvaise saison, elle a été observée dans le Haut-Bosphore, dans les ruines des Châteaux d'Europe et d'Asie, contre les anciennes murailles de Stamboul.

81. *Certhia familiaris*, L. — le Grimpeur. Cette espèce sédentaire est surtout commune dans les cimetières musulmans.

82. *Upupa epops*, L. — la Huppe. Dans la belle saison nous n'avons observé cet oiseau qu'aux endroits où l'on menait paître les buffles et les boeufs, ainsi au fond de la Corne d'Or, entre Kiahathané et Djendéré. — Dès la mi-août le passage commence, les huppées sont alors nombreuses, ainsi le 20 août 1892. nous avons noté: „Marchand de gibier, rue de Péra, beaucoup de Rolliers, de guépiers, de huppées et de pies-grièches.

Musée Coll. amér.: deux exemplaires.

83. *Lanius excubitor*, L. — la Pie-grièche grise. Espèce de passage régulier, plus abondante en automne qu'au printemps.

Musée Coll. amér.: trois exemplaires.

84. *L. meridionalis*, TEMM. — la Pie-grièche méridionale. Rare, représentée dans la Collection ornithologique du Coll. amér.

85. *L. minor*, L. — la Pie-grièche à poitrine rose. Commune aux deux passages annuels (voir note 82), surtout en automne.

Musée Coll. amér.: quatre exemplaires.

86. *L. rufus*, Br. = *L. senator*, L. — la pie-grièche rousse. Nous n'avons point observé cette espèce, mais la Collection du Coll. améric. en possède un sujet, provenant de la région.

87. *L. collurio*, L. — la pie-grièche écorcheur. Espèce nicheuse sur les deux rives du Bosphore. Fait une chasse constante à certains Orthoptères (*Caloptenus italicus*, *Oedipoda fasciata*, *Decticus*, *Locusta*, *Truxalis nasuta*, *Ephippigera*, etc.) ainsi qu'aux Coléoptères: *Carabus*, *Poecilus*, *Harpalus*, *Staphylinus*, *Phyllopertha*, *Cetonia*, *Chrysomela*, etc.

88. *L. nubicus*, Lcht. = *L. personatus*, Temm. — la pie-grièche à masque. Espèce rare, mais nichant dans la contrée, ALLEX dit avoir capturé des jeunes, encore en premier plumage, aux environs de Constantinople. Cette espèce est aussi représentée au Musée du Coll. américain.

89. *Muscicapa (Butalis) grisola*, L. — le Gobe-mouches gris. Oiseau nicheur, se rencontrant également nombreux sur les deux rives du Bosphore, fréquente le voisinage des habitations et les jardins maraîchers plantés de mûriers ou de figuiers. En juillet 1890, ce butalis nichait à Halki (Ile des Princes).

Musée Coll. améric.: deux mâles, une femelle.

90. *M. parva*, L. = *Erythrosterina parva*, BECHST. — le Gobe-mouches rougeâtre. De passage régulier au printemps, abondant en automne dans les vignes (Erenkeui, côte asiatique) et les jardins.

Musée Coll. améric.: un mâle juv., quatre femelles.

91. *M. atricapilla* = *luctuosa*, L. = *M. nigra*, BRISS. Observé aux passages annuels.

Musée Coll. améric.: Un mâle, trois femelles.

92. *M. albicollis*, TEMM. (= *collaris*, BECHST.) le gobe-mouches à collier. De passage régulier.

Musée Coll. améric. trois mâles et une femelle.

Dès la fin de Septembre et en Octobre encore on observe surtout les juv. de l'année des trois dernières espèces.

93. *Bombycilla garrula*, TEMM = *Ampelis garrulus*, L. — le Jaseur d'Europe. De passage très irrégulier, se montre dans les hivers froids: ainsi en 1890—1891 l'espèce fut signalée sur la rive européenne (Bouyouk Déré, Bebek, Arnaout Keui, Pancaldi) et aux environs de Scutari d'Asie (à Jeni Mahallé, Baghlarbachi), jusqu'à Moda, Phanaraki, Cartal et Pendik.

Musée Coll. améric.: trois exemplaires.

94. *Accentor modularis*, L. — l'accenteur mouche. Espèce hivernante se rencontrant le long du Kiahathané Sou, sur les hauteurs de Chichli, parmi les cistes et les panicauts (*Elyngium*) desséchés, à Maslak dans les bruyères arborescentes. Au Boulgourlou (Scutari d'Asie) nous l'avons trouvé se cachant dans les petits chênes Kermès (*Quercus coccifera*, L.) et les *Poterium spinosum*.

Musée Coll. améric.: trois exemplaires.

95. *Troglodytes parvulus*, L. — le Troglodyte. Espèce sédentaire, mais peu répandue, nous l'avons observée ré-

gulièrement dans le cimetière de Bulbul Déré (Scutari), à Tchamlidja, dans le grand cimetière de Scutari d'Asie, à Pancaldi de Constantinople, aux cimetières latin et anglais de Feri Keui.

Musée Coll. améric.: espèce représentée.

96. *Cinclus aquaticus*, L. — le Cincle plongeur. Observé en hiver le long du Kiahathané Sou: en mars 1892, un individu chantait sur le bord du Nouveau Bend du Sultan Mahmoud, près de Baghtché Keui.

Espèce représentée dans la collection ornithol. du Coll. améric.

97. *Poecile palustris*, L. — la mésange nonnette. Espèce sédentaire, mais peu commune.

Musée Coll. améric.: deux exemplaires.

98. *Parus lugubris*, NATT. — la mésange lugubre. Au premier coup d'oeil elle ressemble beaucoup à notre nonnette, elle en diffère cependant par sa plus grande taille et son plastron foncé beaucoup plus étendu. Observée, en petits groupes de 7 ou 8 individus, assez régulièrement à la mi-mai le long du Kiahathané Sou.

Musée Coll. améric.: deux exemplaires.

99. *P. ater*, L. — la més. petite charbonnière. Peu commune, très erratique, observée dans la belle saison dans les forêts de Belgrade (Europe) et d'Alemdagh (Asie).

Musée Coll. améric.: trois exemplaires.

100. *P. major*, L. — la més. charbonnière. Espèce nicheuse, commune.

Musée Coll. améric.: deux exemplaires.

101. *P. coeruleus*, L. — la més. bleue. Espèce nicheuse, assez commune, surtout en hiver.

Musée Coll. améric.: trois exemplaires.

102. *Acredula caudata*, L. — la més. à longue queue. Les individus que nous avons observés avaient la tête entièrement blanche, ce qui nous a laissé soupçonner que nous étions en présence de la forme *Acredula caudata macedonica*, DRESS.: parfois quelques-uns se rapprochaient du type *A. c. rosea* (v a g a n s), LATH.

Cette lardère varie beaucoup dans son plumage, suivant l'âge et la saison. Au Musée du Coll. améric. se trouve un sujet étiqueté: *Parus longarius* (?) que nous rattachons au type à tête blanche.

103. *P. tephronotus*, GÜNTH. — la més. à longue queue de Günther. Cette variété des environs de Constantinople est représentée par trois exemplaires au Coll. améric.

104. *Panurus biarmicus*, L. — la més. à moustaches. Observée à son passage du printemps dans les phragmites du Kiahathané Sou.

105. *Aegithalus pendulinus*, L. — la més. rémiz. Espèce de passage, vue au printemps dans les saules du Kiahathané Sou. (Nous possédions un nid avec un juv. emplumé, venant d'Adana en Cilicie.)

(A suivre.)