

## Ornithologische Beobachtungen in Griechenland.

(Im September und Oktober 1923)

Von Oberst a. D. Georg Veith.

Die Reise ging von Brindisi über Korfu - Patras nach Athen (17./19. IX), von dort am 25. IX mit der Bahn nach Larissa, daselbst und in der Gegend Demerli - Pharsalos Aufenthalt bis 7. X, dann Autofahrt über Ellassona-Serria nach Kozani in Griechisch-Mazedonien. Dort Aufenthalt bis 11. X, dann mit Auto und Bahn über Sorovic'-Edena-Saloniki nach Larissa (13. X) und weiter mit der Bahn nach Athen. Von da 17./19. X Abstecher in die Umgebung von Theben in Böotien. Schliesslich Athen und Umgebung bis 26. X.

Im folgenden sind nur jene Arten aufgenommen, die sicher angesprochen werden konnten. Jene, bei denen dies nicht der Fall war, zumal zahlreiche Sing- und Wasservögel, wurden nicht berücksichtigt.

Ausser den angeführten Arten wurden keinerlei andere Raub- und Krähenvögel, Reiher u. s. w. beobachtet, ebenso keine Spechte.

*Monticola s. solitarius* (Blaumerle): 29. IX Akropolis von Pharsalos. *Cinclus c. meridionalis* (Südl. Wasserstar): 19. IX am Isthmisdurchstich von Korinth ein Stück. *Sitta n. neumeyer* (Felsenkleiber): 8. X, Ellassona. *Sturnus v. vulgaris* (Star): 12. X, Sorovic' mehrere Flüge. *Corvus c. corax* (Kolkrahe): überall, doch nur vereinzelt oder paarweise. 29. IX Pharsalos, 14. X Thermopylen, 16. X Salamis, 18. X Leuktra, 20. X Lykabetos (Athen) und 24. X Hymettos. *Corvus c. cornix* (Nebelkrähe): sehr selten. 14. X südl. Domokos (Thessalien). *Coloeus monedula spermologus* (Dohle): in allen Ortschaften massenhaft. *Pica p. pica* (Elster): überall massenhaft. *Garrulus gl. glandarius* (Eichelhäher): in Alt-Griechenland nicht beobachtet; in Mazedonien überall häufig. *Chelidon r. rustica* (Rauchschwalbe): 26. IX und die folgenden Tage grosse Flüge in Thessalien. *Apus m. melba* (Alpensieger): 28. IX grösserer Flug am Gipfel des Dogantschi. *Upupa e. epops* (Wiedehopf): 26. IX Orphana (b. Demerli'), 1. X und 2. X bei Larissa viele. *Alcedo i. ispida* (Eisvogel): am Peneus bei Larissa häufig. *Circus æ. æruginosus* (Sumpfwiehe): in allen Niederungen häufig. 1. X bei Larissa ein Stück mit lichtgrauen Steuerfedern. *Circus macrourus* (?) (Steppenwiehe): 26. IX Demerli' ein ♂. *Accipiter g. gentilis* (Habicht): 13. X Larissa. *Accipiter n. nisus* (Sperber): 18. X Theben, 25. X Athen. *Buteo b. buteo* (Mäusebussard): überall gemein und scheinbar am Zug. Besonders massenhaft Ende September in Thessalien. Zahlreiche Stücke bis Ende Oktober zu beobachten. *Buteo f. ferox* (Adlerbussard): besonders in Thessalien nicht selten! 26. IX, 30. IX, 3. X, und 14. X bei Larissa, 3. X bei Demerli', 8. X Ellassona, 14. X Doxara (nördl. Demerli'), 14. X Domokos ein Exemplar mit sehr lichten Steuerfedern, 19. X Theben. *Aquila chr. chrysaetos* (Steinadler): ziemlich häufig, oft in Ge-

sellschaft von *Gyps. fulvus*. 25. IX Thermopylen, 26. IX und 4. X Demerli', Vanca bei Kozani (Mazedonien), 18. X Leuktra (Böotien) zwei Stück! *Milvus m. milvus* (Roter Milan): 18. X bei Leuktra mehrere Stücke, 21. X Marathon. *Falco peregrinus brookei* (Wanderräuber): 18. X bei Leuktra ♂♀. *Falco s. subbuteo* (Baumfalk): 18. IX Kanal von Korfu, 26. X Demerli'. *Cerchneis t. tinnunculus* (Turmfalk): ab 25. IX besonders in Thessalien massenhaft am Zug. Im Oktober bedeutend weniger, doch einzelne Stücke bis zum Schluss. *Neophron p. percnopterus* (Schmutzgeier): 26. IX Demerli' drei Stück. *Gyps f. fulvus* (Weisskopfgeier): überall häufig. 25. IX Thermopylen, 26. IX Demerli', 28. IX Berg Dogantschi (bei Demerli'), 3. X Demerli', 25. X Athen. Meist in grösseren Gesellschaften. *Aegyptius monachus* (Kuttengeier): 24. X Hymettos (Attika) zwei Stück. *Columba l. livia* (Felsentaube): 10. X Siatista (Mazedonien) ein grosser Flug. *Streptopelia d. decaocto* (Lachtaube): 26. IX Chazompazi (b. Demerli') drei Stück und 29. IX, 3. X, 4. X Larissa! *Alectoris gr. græca* (Griech. Steinhuhn): 23. IX bei Phylae (Attika) eine Feder! 8. X Ellassona zwei Stück im Käfig. *Coturnix c. coturnix* (Wachtel): 28. IX und die folgenden Tage zahlreich in Thessalien. *Ardea c. cinerea* (Grauer Reiher): 29. IX Enipeus und Demerli' drei Stück; 12. X am Ostrovo-See zahlreich. *Ardea p. purpurea* (Purpurreiher): 12. X südlich Edena ein Stück. *Ciconia c. ciconia* (Weisser Storch): in Larissa mehrere Horste. Vögel schon fort. *Fulica a. atra* (Wasserhuhn): 12. X grosse Mengen im Ostrovo-See. *Megalorhis gr. grus* (Kranich): 12. X in der Ebene Egri Budzak zahlreiche grosse Flüge weidend. *Otis t. tarda* (Grosstrappe): 28. IX Doxara am Südfuss des Dogantschi und 30. IX Derengli' (westlich Pharsalos). *Gallinago g. gallinago* (Bekassine): 14. X am Kopais-See (Böotien) ein Jäger mit zahlreichen dort erlegten Stücken. *Phalacrocorax c. carbo* (Kormoran): 12. X am Ostrovo-See drei Stücke.



### Vogelschutz.

Protection des oiseaux.



#### Von einem Steinadlerabschuss.

In verschiedenen Zeitungen war die nachstehende Notiz Ende Dezember 1923 zu lesen:

„Ein Steinadler geschossen. Aus Langnau wird uns geschrieben. Im Obstgarten des Heimwesens zu Obeningohl, Gemeinde Langnau, ist letzter Tage ein Steinadler geschossen worden. Es handelt sich um ein altes, ausgewachsenes Männchen von 3,8 Kilogramm Gewicht und 2,05 Meter Spannweite. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass ein sehr altes Exemplar dem todbringenden Blei erlegen ist. Es hat sich beispielsweise dieses Jahr nicht gemausert. Dieser Umstand mag unsere Naturfreunde und Naturschützer, welche mit Recht die Erlegung des selten gewordenen Raubvogels bedauern, versöhnen. Der Adler wurde von unserer Sekundarschule erworben, wird von Herrn Präparator GRUMM in Bern